Estudio y revisión del lóbulo de la ácigos

David González Peinado

Grado de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
dgpeinado@estumail.ucm.es

Luis Alfonso Arráez Aybar

Departamento de Anatomía II. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
arraezla@med.ucm.es

Resumen: el lóbulo de la ácigos es una variación frecuente (1% de cadáveres, 0,4% de las radiografías) que podemos observar en las radiografías de tórax como una estrecha línea (fisura de la ácigos), e incluso podemos llegar a ver la unión de la vena ácigos con la vena cava superior. Ocurre cuando la vena ácigos falla al migrar sobre el ápex del pulmón y en lugar de esto lo penetra, llevándose consigo parte de la pleura (que será llamada mesoácigos) y quedando envuelta en el lóbulo superior derecho del pulmón, que continuará creciendo. Finalmente, cuando finalice el desarrollo, el lóbulo superior derecho quedará dividido, dando lugar a un lóbulo más pequeño al que denominaremos lóbulo de la ácigos. En este trabajo, vamos a profundizar en el desarrollo y la anatomía del lóbulo de la ácigos, y haremos una revisión de los artículos existentes en la literatura médica sobre el tema. Además, vamos a explicar también el fenómeno llamado “desvanecimiento del lóbulo de la ácigos” que ocurre de forma muy infrecuente, y que consiste en la migración del lóbulo de la ácigos fuera de la localización ectópica en la que se encuentra. Vamos a centrarnos en un trabajo en el que se explican las causas de esta “desmigración”, donde se la asocia a un aumento en la presión torácica (por pneumotórax, vómitos frecuentes, etc.) Por último, relacionaremos lo que hemos visto anteriormente con la posible patología asociada, describiendo algunos artículos que han encontrado esta relación y si efectivamente son estadísticamente significativos sus resultados.

Oral

Recibido: 11 marzo 2012.
Aceptado: 13 abril 2012.