

Caso clínico de paciente con microtropia

Chan Voong

Óptica y optometría. E.U. Óptica. Universidad Complutense de Madrid. . Arcos de Jalón Nº 118. 28037 Madrid.

chanvoong@estumail.ucm.es

Ricardo Bernardez Vilaboa

Óptica y optometría. E.U. Óptica. Universidad Complutense de Madrid. C. Arcos de Jalón Nº 118. 28037 Madrid.

Resumen: La presentación del póster trata de un paciente que padece de microtropia, que es una alteración visual de tipo estrábica. El estrabismo es una desviación de los ejes visuales de un ojo respecto al otro y viene generada por acciones anómalas de los músculos del globo ocular. Esto provoca ciertos signos y síntomas, como un posible grado de ambliopía y una mala respuesta retiniana. Cuando el ángulo de desviación es casi inapreciable se puede decir que es una microtropia. Se puede clasificar en dos tipos: primaria y secundaria. La primaria se engloba toda microtropia congénita y la secundaria un derivado de un tratamiento quirúrgico de un estrabismo mayor. A nuestro paciente se le harán las pruebas necesarias para el diagnóstico y se procederá a hacerle un tratamiento

Palabras clave: Estrabismo. Microtropia. Ambliopía.

[Póster](#)

Recibido: 11 marzo 2012.

Aceptado: 13 abril 2012.