

Cataratas seniles

Patricia Maté González

patrimg65@gmail.com

Tutor

Ángel Gutiérrez Hernández

Resumen: Las cataratas seniles son, con diferencia, la forma más frecuente de catarata (90% de las cataratas). Aproximadamente el 5% de las personas mayores de 70 años y el 10% de las mayores de 80 años presentan este tipo de cataratas que generalmente requieren intervención quirúrgica.

La catarata es una patología que se produce en el cristalino y se caracteriza por la opacificación del mismo, es decir, por la pérdida de transparencia del cristalino. Dependiendo de la zona del cristalino donde aparezca la opacificación, las cataratas reciben un nombre característico. Así, dentro de las cataratas seniles, las más comunes son: la catarata nuclear, la catarata cortical y la catarata subcapsular posterior.

A su vez, dependiendo del estadio de evolución de dichas cataratas, podemos clasificar las cataratas en incipientes, intumescientes, maduras e hipermaduras.

Algunos de los principales síntomas de las cataratas seniles son disminución de la visión, velo grisáceo y pérdida parcial de la imagen, visión borrosa o distorsionada y deslumbramiento, entre otros.

Una vez diagnosticada la catarata, el principal tratamiento es la cirugía. Esta consiste, principalmente, en la extracción del cristalino y en la posterior colocación de una lente intraocular. Existen diferentes técnicas quirúrgicas, pero la más utilizada actualmente es la extracción extracapsular de la catarata (EECC) con implante de lente intraocular. Las probabilidades de éxito de esta operación son muy elevadas y generalmente el paciente recupera gran parte de la visión perdida.

Palabras clave: Catarata. Senil. Cristalino. Opacidad.

[Revisión Bibliográfica](#)

[Póster](#)

Recibido: 29 marzo 2011.

Aceptado: 1 abril 2011.