

Risperidona

Irene Taladriz Sender. Teresa María Querol Ortiz.

Licenciatura en Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Plaza Ramón y Cajal s/n. Ciudad Universitaria. Madrid. 28040.
iretaladriz@gmail.com

Santiago Torrado Durán.

Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Plaza Ramón y Cajal s/n. Ciudad Universitaria. Madrid. 28040.
torrado2@farm.ucm.es

Resumen: La Risperidona es utilizada en el tratamiento de la esquizofrenia. Las posibles formas farmacéuticas son: comprimidos, comprimidos recubiertos con película, comprimidos bucodispersables y polvo y disolvente para suspensión de liberación sostenida para inyección intramuscular. Estas formas son microesferas en las cuales la Risperidona va microencapsulada con el polímero biocompatible poli- (D,L lactido-co-glicolido). Estas suspensiones permiten una pauta posológica de dos semanas, con concentraciones plasmáticas más sostenidas. Esta forma de liberación modificada, tiene la ventaja adicional de que evita el incumplimiento terapéutico que se produce en muchos pacientes.

Palabras clave: Risperidona. Liberación sostenida. Forma administración.

[Póster](#)

Recibido: 11 marzo 2012.
Aceptado: 13 abril 2012.