

Caries de aparición precoz: biberón y lactancia materna

Cristina Sanz Bosch. Natalia Santos Vinuesa.

Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
cris.sanz@live.com

Gloria Saavedra Marbán

Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid
gsaavedr@pdi.ucm.es

Resumen: La caries rampante es un ataque agudo de caries que incluye a muchos dientes en superficies que no suelen ser susceptibles. Las lesiones son extensas y de inicio súbito. Suele ocurrir en niños y adolescentes aunque también puede darse en adultos y puede ser debida al consumo exagerado de hidratos de carbono, mala higiene oral, reducción del flujo salival, factores psicológicos, etc. En un principio, se acuñó el término de “caries de biberón” para definir una forma severa de caries que se asociaba al uso prolongado de éste. Posteriormente, se consideró que la alimentación con lactancia materna a demanda también podía causar esta patología. En las dos últimas décadas se ha reconocido que esta caries de aparición temprana no está sólo causada por hábitos alimentarios, si no que al igual que la caries de aparición en etapas posteriores es una enfermedad infecciosa que tiene una causa multifactorial. La etiología, el aspecto clínico, la prevención y el tratamiento de la caries de biberón y por lactancia materna serán puntos a desarrollar en este trabajo. Estas caries de la primera infancia llevan a consecuencias físicas, funcionales y de comportamiento que afectan negativamente a la calidad de vida del niño, por eso una importante estrategia de prevención es instituir programas educacionales a los padres.

Palabras clave: Rampante. Biberón. Lactancia materna. Carbohidratos.

Oral

Recibido: 11 marzo 2012.

Aceptado: 13 abril 2012.