

Diagnóstico diferencial osteoma y odontoma en mandíbula de gato doméstico (*Felis catus*)

Rubén Jiménez González. Mario Gayo Mateo. Sara García Miguélez.

Veterinaria. UAX.
rubi_j_g@hotmail.com

Antonio Rodríguez Blanco

Facultad de Veterinaria Alfonso X el Sabio. Villanueva de la Cañada. Madrid.

Resumen: Tesla, felino, raza Persa, hembra, 18 años de edad y 4,5 kg de peso acude al Hospital Clínico Veterinario UAX 4/06/2009. El paciente referido con historia de masa crecimiento progresivo 6 años y de 1 kg de peso localizado en el cuerpo mandibular. Con las radiografías y la TC, nuestros diagnósticos diferenciales eran el osteoma y el odontoma. Los osteomas son neoplasias benignas raras de hueso, lesiones de crecimiento lento. Suelen ser de crecimiento lento, indoloros salvo cuando ejercen acción mecánica sobre estructuras vecinas, pero producirán una gran masa ósea visible y palpable. Si existe dolor, no van a estar asociado al crecimiento del hueso en sí mismo sino que se asocia más al aumento de la presión de la zona o a las consecuencias de dicho crecimiento. El odontoma es el tumor odontogénico mixto con mayor frecuencia de aparición y son de crecimiento limitado, asintomáticos, producen retención dentaria y requieren resolución quirúrgica. No obstante, las principales diferencias entre ambas neoplasias son la cirugía y los resultados obtenidos tras el estudio anatomopatológico de la muestra. En la actualidad, hay tan sólo 7 casos descritos de osteoma mandibular felino, 3 de los cuales fueron eutanasiados, a 1 se le practicó una mandibulectomía, a 1 una maxilectomía y 2 mediante citorreducción. En nuestro caso, la resolución fue quirúrgica mediante biopsia excisional, Tras el diagnóstico de la neoplasia, que fue osteoma y, después de un año tras la cirugía llevada a cabo se produjo bienestar general, falleciendo sin recidiva por muerte natural

Palabras clave: Cirugía. Gato. Mandíbula. Osteoma. Odontoma.

[Oral](#)

Recibido: 11 marzo 2012.
Aceptado: 13 abril 2012.