

Liquen plano

Manuel Jesús Sánchez González

manuj_daniel@hotmail.com

Coautor

Roberto Antonio Palacios Garrán

Tutor

Natalia García Gómez

Resumen: El liquen plano es una enfermedad dermatológica consistente en una erupción papular, pruriginosa (produce picor), inflamatoria, de curso crónico que afecta a la piel y mucosas. Dichas pápulas tienen predilección por el tronco y las superficies flexoras; las lesiones pueden ser pequeñas o coalescer en placas. La mucosa oral se afecta presentando una red blanquecina en la zona yugal y encías, o placas tipo leucoplasia o placas rojo brillante, o erosiones dolorosas. Histológicamente, se encuentran un patrón de "dientes de sierra" con hiperplasia de la epidermis y alteraciones vacuolares de la capa basal de la epidermis, junto con un intenso infiltrado inflamatorio en banda en la parte superior de la dermis compuesto predominantemente por linfocitos T. En la unión dermo-epidérmica es posible observar la formación de hendiduras conocidas como espacios de Max-Joseph, así mismo se observan numerosos cuerpos eosinófilos conocidos como cuerpos eosinofílicos de Civatte.

El origen del LP es desconocido. Muchos dermatólogos la consideran una enfermedad autoinmune, causada por las propias defensas del organismo que atacan a las células de la piel. Lo que sí se conoce es que ésta enfermedad no es contagiosa, no es una forma de cáncer de piel ni está relacionada con la alimentación.

En el diagnóstico, la mayoría de las ocasiones es suficiente con ver las lesiones, aunque en algunos casos es conveniente confirmar el diagnóstico tomando una muestra de piel para analizarla mediante una biopsia cutánea. El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas y acelerar la cicatrización de las lesiones cutáneas.

[Investigación Básica](#)

[Póster](#)

Recibido: 23 marzo 2011.

Aceptado: 26 marzo 2011.