

Estudio de la relación entre hábitos y maloclusiones en la población infantil

María Noguerado Mellado

marianoguerado@gmail.com

Tutor

Rosa Mourelle Martínez

Resumen: Los niños que han tenido lactancia materna, realizan más ejercicios musculares que cuando lactan de un biberón, agotándose más y necesitando en menor medida de la succión no nutritiva. En algunos casos la succión digital, la persistencia del chupete y la onicofagia, favorecen la instauración de maloclusiones.

Objetivos:

- 1) Relación entre el desarrollo de maloclusiones y persistencia de hábitos.
- 2) Distribución de hábitos y maloclusiones según edad, sexo y nivel socioeconómico.

Material y métodos: Se realizará una revisión acerca de los hábitos en el paciente infantil, evaluando la *succión no nutritiva* y valorando si la patología es consecuencia directa o no, del hábito del niño y que otros elementos intervienen a ello y a su distribución. Se revisaron historias clínicas del Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM.

Resultados: En la revisión de historias clínicas se comprobó que existe relación entre hábitos de succión no nutritiva y maloclusiones en la muestra estudiada.

Conclusiones: Los hábitos de succión no nutritiva tienen una incidencia elevada en la población infantil, siendo el más frecuente la succión digital (pulgar), seguida del uso prolongado del chupete y por último la onicofagia.

Etiológicamente no existe un consenso sobre la relación entre maloclusión y hábito, como único factor etiológico, pues también las mordidas abiertas y cruzadas, se desarrollan en pacientes con ausencia de estos hábitos.

Encontrándose que el grupo de mayor riesgo fue el de las niñas de nivel socioeconómico bajo.

Investigación Básica
Comunicación Oral

Recibido: 24 marzo 2011.
Aceptado: 26 marzo 2011.