

Porfiria cutánea tarda: un caso simulado

Noemi Arriero Fernández

naf_797@hotmail.com

Coautores

Carolina Gabriela González Olivares. Irene Ortiz Martín

Tutores

Elena Vara Ameigeiras. Lisa Rancan

Resumen: Las porfirias (P) son un grupo heterogéneo de enfermedades causadas por trastornos en el metabolismo del grupo hemo. La mayor parte de ellas tienen clínica cutánea producida por la capacidad fotosensibilizante de las porfirinas. La más frecuente de las porfirias es la denominada "P. Cutánea Tarda" (PCT).

Objetivos: El presente trabajo pretende realizar una síntesis de los conocimientos actuales de las porfirias, incluyendo etiopatogenia, clínica, diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento, con especial interés en la PCT.

Material y métodos: Se ha revisado el archivo de historias clínicas y de fotografías del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Se ha revisado la bibliografía reciente en relación con las porfirias.

Resultados: Se presenta un caso clínico simulado que permite presentar las manifestaciones clínicas más importantes de la PCT y que sirve de apoyo para comentar patogenia, diagnóstico diferencial y tratamiento de las porfirias.

Agradecimientos: Profesor Pablo L. Ortiz Romero. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre.

Palabras clave: Porfirias. Etiopatogenia. Tratamiento.

[Revisión Bibliográfica](#)
[Comunicación Oral](#)

Recibido: 24 marzo 2011.
Aceptado: 26 marzo 2011.