

Miope de raza asiática con exoforia básica

Juan José Benito García

juanho_se_bg@hotmail.com

Coautor

María José González Melendo

Tutor

Isabel Sánchez Pérez

Resumen: Se presenta un caso clínico correspondiente a un paciente asiático de 20 años, estudiante, que manifiesta visión borrosa con el ojo izquierdo en visión lejana durante todo el día. El paciente es usuario de gafas desde los 12 años y lentes de contacto desde hace 5. Presenta antecedentes familiares de miopía alta.

Los síntomas que refiere nos dan un diagnóstico tentativo de aumento simple de la miopía.

Tras la revisión bibliográfica realizada encontramos que es muy normal encontrarnos una miopía en pacientes de esta raza ya que prevalece (1) con un 30% este error refractivo en jóvenes asiáticos. En este tipo de población también es más frecuente encontrar exotropías que endotropías con una proporción de 7:1 respectivamente según la bibliografía consultada (2).

Tras las pruebas refractivas concluimos que el paciente tiene un aumento de la miopía con respecto a su graduación antigua, acompañado de una leve exoforia básica. El tratamiento refractivo resuelve ambas alteraciones.

Palabras clave: Miopía. Asiático. Exoforia. Exoforia básica.

Bibliografía:

- (1) Revista Española de Contactología Tomo XIII año 2006, artículo "Lentes de Contacto y progresión de la miopía", JORGE J, GONZÁLEZ-MÉIJOME JM, VILLA C.
- (2) Prevalence of amblyopia and strabismus in young singaporean chinese children, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Jul. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20207979>.

Caso Clínico
Póster

Recibido: 25 marzo 2011.
Aceptado: 31 marzo 2011.