Linfoma cutáneo canino epiteliotrópico; el gran imitador en dermatología

María Velasco Callejo

ari_mvc@hotmail.com

Tutor

José Luis González Arribas

Resumen: El linfoma cutáneo canino es una neoplasia maligna cuya prevalencia está entre el 3% y el 8% de todas las formas de linfoma. Esta neoplasia se clasifica según sus características clínicas e histopatológicas en: linfoma cutáneo epiteliotrópico y en no epiteliotrópico. En el presente trabajo se expone las diferentes formas clínicas que puede presentar el linfoma cutáneo epiteliotrópico y las dificultades en el diagnóstico que ello conlleva.

Los animales presentan síntomas de enfermedad sistémica y linfadenopatías periféricas acompañadas de lesiones cutáneas de las cuales se han descrito cuatro presentaciones clínicas diferentes. Estas variedades de alteraciones cutáneas complican el diagnóstico, siendo necesario descartar otras enfermedades que presentan los mismos signos clínicos dermatológicos. Dentro de las lesiones cutáneas podemos encontrar: eritema exfoliativo, despigmentación y ulceración mucocutánea, placas o nódulos cutáneos de presentación múltiple y úlceras en la mucosa oral. Cada una de estas lesiones se puede confundir respectivamente con procesos alérgicos y/o seboreicos, con enfermedades autoinmunes, con procesos inflamatorios o bien con alteraciones en el desarrollo.

El diagnóstico de esta enfermedad requiere tener en cuenta la edad del animal, su historia clínica, los signos clínicos sistémicos y cutáneos y la histopatología. Dentro de los cutáneos hay que evaluar por ejemplo la presencia o no de prurito, si hay un cambio de apariencia o de tamaño en las lesiones y examinar los nódulos en cuanto a aspecto, profundidad y movilidad.

La realización de una biopsia será necesaria ya que sirve para confirmar el diagnóstico y clasificar histológicamente el tumor.

Palabras clave: Linfoma cutáneo epiteliotrópico. Lesiones. Diagnóstico.

[Revisión Bibliográfica](#)
[Comunicación Oral](#)

Recibido: 28 marzo 2011.

Aceptado: 1 abril 2011.