

Diagnóstico precoz de la displasia de cadera en perros y prevención de la osteoartritis

Beatriz Fernández Fuertes

bffuertes@estumail.ucm.es

Coautor

María Ramírez Andrés

Tutor

Manuel Gardoqui Arias

Resumen: La displasia de cadera es una enfermedad del desarrollo que constituye la patología ortopédica más común en los perros de raza mediana y grande. Un gran porcentaje de los perros afectados muestran síntomas leves, sin embargo, la laxitud articular de la pelvis se considera un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad articular degenerativa.

Los tratamientos tradicionales, quirúrgicos y conservadores, de los perros adultos que presentan esta patología son caros, agresivos y, en muchas ocasiones, inefectivos a la hora de eliminar los signos clínicos y de prevenir el desarrollo de enfermedad articular degenerativa. Mediante la implantación de técnicas de diagnóstico precoz en perros jóvenes con predisposición a la enfermedad, podemos llevar a cabo un tratamiento temprano que disminuya, e incluso haga desaparecer, la presencia de síntomas clínicos en el animal adulto, mejorando, por tanto, su calidad de vida.

Palabras clave: Canino. Displasia de cadera. Laxitud pélvica. Medidas preventivas.

[Revisión Bibliográfica](#)
[Comunicación Oral](#)

Recibido: 29 marzo 2011.

Aceptado: 3 abril 2011.