

Queratocono con tratamiento de anillo intraestromal

María Isabel Martínez Abián

bixote_maribel@hotmail.com

Coautor

Rebeca Mínguez González

Tutor

Ricardo Bernárdez Vilaboa

Resumen: D.E.O varón de 36 años, el cual es diagnosticado de queratocono en ambos ojos hace 10 años. Presenta antecedentes en la familia ya que el hermano también tiene queratocono. Actualmente se encuentra bajo tratamiento médico con medicamentos que disminuyen su amplitud de acomodación y la producción de secreción acuosa. Al realizar refracción ocular, diagnosticamos un astigmatismo miópico simple en ambos ojos. Tiene síntomas de sequedad ocular debido a que presenta lagofthalmos entre otras cosas. Su presión intraocular es baja en ambos ojos y diferente entre ellos, esta PIO tan baja se debe al estrechamiento de la cornea por el queratocono. Observamos que su estado binocular está alterado en visión lejana.

En el examen con el biomicroscopio ocular, se puede apreciar medios transparentes, glándulas de Meibomio saturadas, película lagrimal grasa, pestañas y párpados grasos.

Al teñir con fluoresceína se observa un lento movimiento lagrimal, punteado en zona inferior y teñido de la superficie ocular.

Tratamiento visual actual: Prescripción en gafas, anillo intraestromal en ojo izquierdo, colirio humectante, higiene palpebral y revisión en 6-9 meses.

Palabras clave: Queratocono. Astigmatismo. Lagofthalmos. Anillo intraestromal. Sequedad ocular.

[Caso Clínico](#)

[Póster](#)

Recibido: 29 marzo 2011.

Aceptado: 1 abril 2011.