

Tumores mamarios caninos: manejo clínico

Sofía Lafuente Carballo

sofialafuentecarballo@gmail.com

Coautor

Andrea García de Salazar Alcalá

Tutores

María Dolores Pérez Alenza. Simón Martí Angulo

Resumen: En la perra, la neoplasia mamaria es el tumor más común. Su importancia reside en la alta incidencia de esta patología, que altera la calidad y esperanza de vida del paciente. El rango medio de edad se encuentra entre los 3-16 años; siendo la edad más frecuente los 10-11 años. Se postula que existe predisposición racial en perras spaniel, caniche y teckel. La incidencia es mayor en hembras enteras; reduciéndose el riesgo al 0,05% de posibilidades de desarrollo de tumoración maligna si se esteriliza antes del primer estro, frente a un 26% si se hace después del segundo estro. Por otra parte, la esterilización siempre disminuye el riesgo de desarrollo de tumores benignos aunque ésta sea tardía.

Aproximadamente, el 60% de los tumores mamarios en la perra son benignos, mientras que un 40% son malignos. Recientemente se ha publicado una nueva clasificación histológica, basada en la conjugación de las ya existentes, siendo esta última más amplia y específica. La aproximación diagnóstica se basa en la evaluación de las características clínicas tumorales (tamaño, adherencia y ulceración) y en el establecimiento del estadio clínico (afectación local, presencia de metástasis regionales, o a distancia). Sin embargo, el diagnóstico definitivo se establece histológicamente, aunque la citología es orientativa. La orientación correcta del protocolo quirúrgico y terapéutico de los distintos casos de tumores mamarios caninos es fundamental; ya que su elevada variabilidad configura la evolución y pronóstico de esta patología.

Palabras clave: Neoplasia. Canina. Mamaria. Clasificación. Tratamiento.

[Revisión Bibliográfica](#)
[Comunicación Oral](#)

Recibido: 1 abril 2011.

Aceptado: 4 abril 2011.