Resolución quirúrgica de atresia anal en un perro

Laura García Carmona

lcarmgar@uax.es

Coautor

Jorge Espinel Rupérez

Tutores

Gustavo Ortiz Díez. Talía Trenado Santos

Resumen: La atresia anal es una patología congénita en la que la abertura del ano está ausente u obstruida. Es poco común y suele ir asociada a una fístula rectovaginal o uretrorrectal.

Caso clínico: Un perro, hembra, mestiza, de dos meses de edad acudió a consulta presentando pérdida parcial de apetito, distensión abdominal y ano imperforado. Se realizó un estudio radiológico observándose dilatación severa de colon y recto.

La técnica quirúrgica reparadora consistió en el cierre de la fístula rectovaginal, la reconstrucción de la vagina y el restablecimiento del final del tracto rectal, suturando la mucosa a la piel.

En el postoperatorio aparecieron dos complicaciones: presencia de parasitosis digestiva, tratada médicamente, y dehiscencia de la sutura externa, producida por el propio lamido del animal, y que fue solucionada quirúrgicamente. Actualmente el animal se encuentra con buena calidad de vida y sin incontinencia fecal.

Discusión: No se conoce realmente la incidencia de la atresia anal en el perro, debido a que la mayoría de los cachorros con esta patología son eutanasiados o mueren descompensados al poco de nacer. Los casos intervenidos quirúrgicamente suelen cursar con incontinencia fecal postoperatoria por ausencia del esfínter anal externo. En nuestro caso no se presentó incontinencia. Otros autores sugieren que la ganancia de peso y el desarrollo de la grasa intrapelvica y perineal pueden suplir la función de dicho esfínter.

Palabras clave: Atresia. Ano. Perro.

[Caso Clínico](#)
[Comunicación Oral](#)

Recibido: 1 abril 2011.

Aceptado: 4 abril 2011.